

Die Wirbeltierklassen-

Lückentext

Die meisten Wirbeltiere gliedern sich grob in Kopf, Rumpf, _____ und Gliedmaßen. Die Körperstütze ist meist ein aus Knochen bestehendes _____.

Man unterscheidet zwischen wechselwarmen und gleichwarmen Wirbeltieren. Wechselwarme Wirbeltiere passen ihre Körpertemperatur der Außentemperatur an. Hierzu gehören die Kriechtiere, die Fische und die _____. Gleichwarme Tiere haben immer eine konstante Körpertemperatur, zu ihnen zählen die Säugetiere und die _____.

Die Körperbedeckung ist bei den verschiedenen Wirbeltierklassen sehr unterschiedlich. Säuger haben beispielsweise eine _____ Haut und _____, Lurche hingegen eine eher _____ Haut und _____.

Auch die Fortpflanzungsstrategien sind sehr unterschiedlich. Grob unterscheidet man zwischen einer Entwicklung aus dem Ei oder _____. Zudem kann zwischen innerer und äußerer Befruchtung unterschieden werden. Äußere Befruchtung betreiben beispielsweise die _____, innere Befruchtung die _____.

Die Atmung erfolgt über _____ oder _____ und das Blutgefäßsystem wird über das _____ angetrieben.